

Lauku kļava

Acer campestre L.

Izplatība. Suga izplatīta Eiropā un Rietumāzijā. Aug biežāk pamežā vai gar meža malu.

Morfoloģija. Koks vai liels krūms, līdz 10 m augsts ar noapaļotu vainagu. Miza tumšbrūni pelēka, rievaina, bieži ar korķainiem izaugumiem. Jaunie dzinumi dzeltenīgi brūni, tievi. Lapas ar 5, retāk 3 daivām, 5,5-8,5 cm garas, 5,4-8,8 cm platas, koši zaļas, apakšpusē pūkainas. Daivas strupas, galotnē asas, malas veselas vai daivainas. Ziedkopa stāva, vairogveida. Ziedi dzeltenzaļi. Spārnuļi līdz 3 cm gari, spārni izplesti horizontāli. Riekstiņš plakans, matains. Zied aprīlī, maijā. Augļi nogatavojas septembrī, oktobrī.

Ekoloģija. Vidēji ziemcietīga līdz ziemcietīga suga. Jaunībā ēncietīga. Labi aug neitrālās vai sarmainās augsnēs, pacieš arī skābu augsni. Sausumizturīga. Bieži cieš no miltrasas.

Nozīme. Dekoratīva suga apstādījumiem. Izmantojama augsto, cirpto dzīvžogu veidošanai.