

Mežvīnu kļava

Acer cissifolium (Siebold et Zucc.) K.Koch

Izplatība. Suga izplatīta Japānā no Hokaido dienvidiem līdz Kiušu centrālajai daļai. Aug kalnu mežos.

Morfoloģija. Neliels koks vai krūms, savvaļā līdz 10 m augsts. Miza pelēka, gluda. Lapas saliktas, ar 3 lapiņām. Lapiņas vienādas, 5,7-10,4 cm garas, 2,2-4,6 cm platas, ovāli eliptiskas vai iegarenas, gari nosmailotas, ar rupji, asi zāgzobainu malu. Virspusē tumši zaļas, apakšpusē dzīslu stūros ar baltiem matiņu pušķiem. Ziedkopa balti pūkains, nokarens ķekars. ziedi sīki, smaržīgi. Spārnuļi līdz 2,5-3 cm gari, izplesti gandrīz taisnā leņķī. Riekstiņš plakans, dzīslains. Zied aprīlī, maijā.

Ekoloģija. Vidēji līdz ziemcietīga suga. Lēni augoša. Pacieš daļēju noēnojumu. Labi aug mitrās, labi drenētās augsnēs. Izturīga pret slimībām un kaitēkļiem.

Nozīme. Dekoratīva suga lieliem un vidēji lieliem apstādījumiem.